

Immunization – Home Instructions

At home instructions

- Expect mild side effects: soreness, redness at injection site, low fever, mild fussiness
- To help ease discomfort:
 - Apply a cool, damp cloth where needed
 - Take acetaminophen or ibuprofen if not contraindicated
 - Drink plenty of fluids
- Watch for rare but serious reactions:
 - Hives, difficulty breathing, swelling of face or throat
 - High fever, or unusual drowsiness
 - Worse symptoms lasting >48 hours

In case of any adverse events; call on the number given in your discharge summary

टिके (वैक्सीन) - घर पर देखभाल की सूचना

घर पर पालन करने योग्य निर्देश:

- हल्के दुष्प्रभावों की संभावना हो सकती है:
 - इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या लालिमा
 - हल्का बुखार
 - हल्की चिड़चिड़ाहट

असुविधा कम करने के उपाय:

- जहां ज़रूरत हो वहां ठंडी, गीली कपड़े की पट्टी लगाएं
- यदि मना न किया गया हो तो एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन लें
- खूब पानी पिएं

कभी-कभी गंभीर लेकिन दुर्लभ प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे:

- पित्ती (hives), सांस लेने में कठिनाई, चेहरे या गले में सूजन
- तेज़ बुखार या असामान्य नींद या सुस्ती
- लक्षण 48 घंटे से अधिक समय तक बने रहना या बिगड़ना

अगर कोई दुष्प्रभाव या समस्या हो तो, डिस्चार्ज सारांश (discharge summary) में दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें।