

Common Side Effects of Warfarin

These effects may vary from person to person. Always follow your doctor's instructions.

- Easy bruising or bleeding (e.g., from gums, nose, or cuts)
- Prolonged bleeding from minor injuries
- Blood in urine or stool (may appear pink, red, or dark)
- Heavy or prolonged menstrual bleeding
- Unusual tiredness or weakness
- Headache or dizziness (possible sign of internal bleeding)
- Allergic reactions such as rash, itching, or swelling
- Nausea or stomach discomfort
- Seek immediate medical attention if you experience:
 - Severe bleeding
 - Vomiting blood or coughing up blood
 - Sudden severe headache, confusion, or difficulty speaking
 - Vision changes

वारफेरिन (Warfarin) के दुष्प्रभाव

ये प्रभाव व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं। हमेशा डॉक्टर की सलाह का पालन करें।

- जल्दी चोट लगना या रक्तस्राव होना (जैसे मसूड़ों, नाक, या कट से)
- हल्की चोट में भी लंबे समय तक खून बहना
- पेशाब या मल में खून आना (गुलाबी, लाल या गहरा रंग दिख सकता है)
- अत्यधिक या लंबे समय तक मासिक रक्तस्राव
- असामान्य थकान या कमजोरी महसूस होना
- सिरदर्द या चक्कर आना (आंतरिक रक्तस्राव का संकेत हो सकता है)
- एलर्जी की प्रतिक्रिया जैसे खुजली, रैश या सूजन
- मतली या पेट में असहजता
- इनमें से कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें:
- अत्यधिक रक्तस्राव
- खून की उल्टी या खांसी में खून आना
- अचानक तेज सिरदर्द, भ्रम, या बोलने में कठिनाई
- दृष्टि में बदलाव